



Amoxicilină Antibiotice 250 mg capsule
Amoxicilină Antibiotice 500 mg capsule
 Amoxicilină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devin gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Amoxicilină Antibiotice și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Amoxicilină Antibiotice
3. Cum să utilizați Amoxicilină Antibiotice
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Amoxicilină Antibiotice
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE AMOXICILINĂ ANTIBIOTICE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Amoxicilina Antibiotice este un antibiotic. Capsulele conțin un medicament numit amoxicilină, care aparține unui grup de medicamente numite "peniciline".

Amoxicilina Antibiotice este utilizat pentru tratamentul infecțiilor în diferite părți ale corpului cauzate de bacterii. Deasemenea, este utilizat pentru a opri infecțiile în cazul unei extracții dentare sau alte intervenții chirurgicale. Amoxicilina Antibiotice poate fi de asemenea utilizată în asociere cu alte medicamente pentru tratamentul ulcerului gastric.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI AMOXICILINĂ ANTIBIOTICE

Nu utilizați Amoxicilină Antibiotice dacă:

- Sunteți alergic (hipersensibil) la amoxicilină, penicilină sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerate la pct. 6)
- Ați avut vreodată o reacție alergică (hipersensibilitate) la orice alt antibiotic. Acest lucru poate include o erupție pe piele sau umflarea feței sau a gâtului.
- dacă aveți o boală determinată de un virus numit Epstein-Barr (mononucleoză), manifestată prin febră, inflamarea ganglionilor, mărirea splinei, inflamația faringelui și amigdalelor;

Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Amoxicilină Antibiotice.

Aveți grijă deosebită când utilizați Amoxicilină Antibiotice

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua acest medicament dacă:

- aveți febră glandulară
- sunteți tratat pentru probleme renale
- nu urinați suficient

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Amoxicilină Antibiotice.

Dacă trebuie să faceți diverse teste de urină sau de sânge pentru funcția hepatică, înștiințați medicul sau asistenta că sunteți sub tratament cu Amoxicilină Antibiotice. Acest lucru se datorează faptului că Amoxicilina Antibiotice poate afecta rezultatele acestor teste.



Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente. Acest lucru include medicamente care pot fi cumpărate fără prescripție medicală și medicamente pe bază de plante. Amoxicilina Antibiotice poate afecta modul în care acționează aceste medicamente. De asemenea, alte medicamente pot afecta modul în care Amoxicilina Antibiotice funcționează.

Amoxicilină Antibiotice nu ar trebui să fie luată împreună cu:

- orice medicament pentru a opri formarea cheagurilor de sânge, cum ar fi warfarina
- allopurinol sau probenecid, medicamente utilizate pentru gută,
- sulfasalazină, antibiotice bacteriostatice, glicozide digitale.

Amoxicilina Antibiotice poate afecta eficacitatea contraceptivelor orale. În acest caz, utilizați măsuri contraceptive suplimentare, cum ar fi prezervativul. Dacă aveți nevoie de orice sfat, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistului.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament, dacă credeți că ați putea fi sau dacă sunteți gravidă, sau dacă alăptați.

Cantități foarte mici de amoxicilină trec în laptele matern; de obicei, în timpul administrării medicamentului, alăptarea nu trebuie întreruptă. Totuși, în cazul apariției diareei, candidozei sau a erupției pe piele la sugar, se întrerupe fie alăptarea, fie administrarea antibioticului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Amoxicilina Antibiotice nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Amoxicilină Antibiotice

Amoxicilina Antibiotice conține p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216). Acestea pot induce reacții alergice (chiar întârziate) și în mod excepțional, bronhospasm.

3. CUM SĂ LUAȚI AMOXICILINĂ ANTIBIOTICE

Luați întotdeauna Amoxicilină Antibiotice exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

-Înghițiți capsulele de întregi cu un pahar de apă la începutul unei mese sau cu puțin înainte.

-Împărțiți doza în mod egal pe parcursul zilei, la cel puțin 4 ore.

-Niciodată nu luați două doze în 1 oră.

-Doza maximă recomandată este de 6 g pe zi, administrată în două doze de 3 g.

Adulți și adolescenți:

Doza recomandată este de 250-500 mg Amoxicilina Antibiotice la fiecare 8 ore. Doza zilnică maximă este de 6 g.

Profilaxia endocarditei: 3 g Amoxicilina Antibiotice, cu 1 oră înainte de procedură. Se pot administra 1,5 g Amoxicilina Antibiotice 6 ore mai târziu, dacă se consideră necesar.

Infecțiile cu *Chlamydia* la femeile gravide: doza recomandată este de 500 mg amoxicilină, la fiecare 8 ore, 7-10 zile.

Gonoree: o singură doză: 50 mg amoxicilină/kg.

Eradicarea *Helicobacter* în ulcerul peptic (gastric și duodenal): doza recomandată este de:

-750 mg-1 g amoxicilina două ori pe zi în asociere cu metronidazol 400 mg pe zi și omeprazol 40 mg de zilnic, sau

-1 amoxicilină g de două ori pe zi în asociere cu claritromicină 500 mg pe zi și omeprazol 40 mg de zilnic.

Tratamentul trebuie continuat timp de 7 zile.

Boala Lyme:

-În eritemul cronic migrator doza recomandată este de 4 g amoxicilina pe zi,

-În cazul în care apar simptome neurologice, anomalii ale inimii și artrită, doza recomandată este de 6 g amoxicilina zilnic, în doze divizate. Tratamentul trebuie continuat timp de 15-21 zile.



Insuficiență renală:

Rata de filtrare glomerulară (ml / min)	Doza zilnică recomandată	Intervalul dintre doze
10-30	500 mg-1 g	12 ore
<10	250 mg-500 mg	12 ore

Copii (de peste 6 ani sau > 20 kg):

Doza recomandată este de 25-50 mg amoxicilină / kg pe zi, divizată în 3 doze (la fiecare 8 ore).

Boala Lyme:

-În eritemul cronic migrator doza recomandată este de 50 mg amoxicilină / kg / zi,

-În cazul în care apar simptome neurologice, anomalii ale inimii și artrită, doza recomandată este de 6 g amoxicilină zilnic, în doze divizate. Tratamentul trebuie continuat timp de 15-21 zile.

Copii cu vârsta sub 6 ani (< 20 kg):

Pentru această categorie de vârstă se utilizează formele farmaceutice adecvate vârstei.

Continuați să luați Amoxicilina Antibiotice până când tratamentul este terminat, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă unele bacterii supraviețuiesc, ele pot provoca reapariția infecției. Continuați tratamentul timp de 2-3 zile după ce simptomele au dispărut. Nu luați Amoxicilina Antibiotice pentru mai mult de 2 săptămâni. Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă luați prea mult Amoxicilină Antibiotice

Luarea oricărui medicament în exces poate avea serioase consecințe. Dacă suspectați supradozajul, anunțați de urgență medicul. Simptomele în cazul supradozajului de amoxicilină sunt: diaree, greață, vărsături, crampe stomacale.

Dacă uitați să luați Amoxicilină Antibiotice

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Nu luați o doză dublă de Amoxicilină Antibiotice decât dacă vă este astfel prescris de către medic.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Amoxicilină Antibiotice poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse au fost clasificate astfel:

Foarte frecvente:	care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți
Rare:	care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare:	care afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută:	care nu poate fi estimată din datele disponibile

Frecvente: diaree și greață, erupții cutanate,

Mai puțin frecvente: vărsături, urticarie și prurit

Foarte rare:-candidoza cutaneo-mucoasă, leucopenie reversibilă (inclusiv neutropenie severă sau agranulocitoză), trombocitopenie și anemie hemolitică reversibilă, prelungirea timpului de sângerare și de protrombină, reacții alergice severe, inclusiv edem angioneurotic, anafilaxie, boala serului și vasculită de hipersensibilitate, hiperkinezie, amețeli și convulsii. Convulsiile pot să apară la pacienții cu insuficiență renală sau la cei care primesc doze mari de amoxicilină. Au mai fost înregistrate: colită

asociate cu administrarea de antibiotice (inclusiv colită pseudomembranoasă și colită hemoragică), limba neagră și păroasă, la copii, a fost raportată modificarea superficială a culorii dinților, icter colestatic, creșterea moderată a AST și/sau ALT, reacții cutanate cum sunt eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, dermatită buloasă și exfoliativă și exantem pustulos acut, nefrită interstițială, cristalurie.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă, sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.



5. CUM SE PĂSTREAZĂ AMOXICILINĂ ANTIBIOTICE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați Amoxicilină Antibiotice după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Amoxicilină Antibiotice

Amoxicilină Antibiotice 250 mg, capsule

-Substanța activă este amoxicilina. Fiecare capsulă conține amoxicilină 250 mg (sub formă de trihidrat).

-Celelalte componente sunt: *conținutul capsulei*: talc, stearat de magneziu; *capacul capsulei*: dioxid de titan (E171), galben de chinolină (E104), Roșu Allura (E129), , p-hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216), gelatină; *corpul capsulei*: dioxid de titan (E171), , p-hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216), , gelatină.

Amoxicilină Antibiotice 500 mg, capsule

-Substanța activă este amoxicilina. Fiecare capsulă conține amoxicilină 500 mg (sub formă de trihidrat).

-Celelalte componente sunt: *conținutul capsulei*: talc, stearat de magneziu; *capacul capsulei*: dioxid de titan (E171), galben de chinolină (E104), Roșu Allura (E129), , p-hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216), gelatină; *corpul capsulei*: dioxid de titan (E171), , p-hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216), gelatină.

Cum arată Amoxicilină Antibiotice și conținutul ambalajului

Amoxicilină Antibiotice 250 mg, capsule

Capsule cu capac de culoare roșu opac și corp de culoare alb opac, care conțin o pulbere granulată de culoare albă sau aproape albă.

Amoxicilină Antibiotice 500 mg, capsule

Capsule cu capac de culoare roșu opac și corp de culoare alb opac, care conțin o pulbere granulată de culoare albă sau aproape albă.

Amoxicilină Antibiotice 250 mg, capsule

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule.

Cutie cu 100 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule.

Amoxicilină Antibiotice 500 mg, capsule

Cutie cu 1 blister din PVC/Al a câte 10 capsule.

Cutie cu 100 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

ANTIBIOTICE S.A.

Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iași, România



Acest prospect a fost aprobat în Mai 2013

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanții locali ai deținătorului autorizației de punere pe piață:

ANTIBIOTICE S.A.

Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iași, România.