



Bromhexin Atb 8 mg comprimate
Clorhidrat de bromhexin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să luați Bromhexin Atb cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

-Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

-Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.

-Trebuie să vă adresați medicului dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 2-3 zile.

-Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nementionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți

1. Ce este Bromhexin Atb și pentru ce se utilizează.
2. Înainte să luați Bromhexin Atb
3. Cum să luați Bromhexin Atb
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Bromhexin Atb
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE BROMHEXIN ATB ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Bromhexin Atb face parte din clasa de medicamente cunoscute sub denumirea de preparate pentru tratamentul tusei și răcelii; expectorante, exclusiv combinații cu antitusive, mucolitice.

Bromhexin Atb împiedică formarea excesivă de mucus vâcos, fluidificând secreția și ușurând tusea.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI BROMHEXIN ATB

Nu utilizați Bromhexin Atb

Dacă sunteți alergic la clorhidrat de bromhexin sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.

Aveți grijă deosebită când luați Bromhexin Atb

-Dacă suferiți de ulcer gastric, boală renală sau hepatică severă, astm bronșic.

-Dacă luați și medicamente antitusive. Luați aceste medicamente în combinație, doar la recomandarea medicului.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Dacă luați acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acțiune. Consultați medicul în condițiile în care mai luați: medicamente antitusive (cum este codeina), sau medicamente iritante la nivelul stomacului.

Administrarea clorhidratului de bromhexin în același timp cu antibiotice (amoxicilină, ampicilină, eritromicină, cefuroximă, doxiciclină, oxitetraciclină) îmbunătățește distribuția acestora la nivel pulmonar.



Folosirea Bromhexin Atb cu alimente și băuturi

Nu se cunosc interacțiuni între Bromhexin Atb și alimente sau băuturi.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu se recomandă administrarea Bromhexin Atb în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Bromhexin Atb nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Bromhexin Atb

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Conține 50,5 mg lactoză monohidrat/doză.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

3. CUM SĂ LUAȚI BROMHEXIN ATB

Luați întotdeauna Bromhexin Atb exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală este la adulți de 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, maximum 6 comprimate pe zi.

La copii cu vârsta sub 10 ani se recomandă utilizarea unor forme farmaceutice adaptate vârstei.

La copii peste 10 ani este de ½-1 comprimat de 3 ori pe zi.

Nu zdrobiți și nu mestecați comprimatele. Înghițiți-le întregi, cu o cantitate suficientă de apă.

Nu depășiți 8-10 zile de tratament fără recomandarea medicului.

Dacă luați mai mult decât trebuie din Bromhexin Atb

Luarea oricărui medicament în exces poate avea serioase consecințe. Dacă suspectați supradozajul, anunțați de urgență medicul.

Dacă uitați să luați Bromhexin Atb

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Este important să nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Bromhexin Atb

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Bromhexin Atb poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Acestea sunt în general ușoare și trecătoare: erupții cutanate, urticarie, dureri abdominale, greață, vărsături, diaree, creșterea valorilor enzimelor hepatice.

Rar, pot apărea și reacții mai grave: tulburări ale sistemului imunitar (reacții de hipersensibilitate): edeme, dificultăți de respirație, febră, frisoane, iar în cazuri izolate poate surveni chiar șoc anafilactic, cefalee, amețeli.

La unii pacienți incapabili de o expectorație eficientă, se poate produce accentuarea obstrucției bronhice;

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BROMHEXIN ATB

- Nu lăsați medicamentele la îndemână și vederea copiilor.
 - Păstrați medicamentul la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original,.
 - Nu utilizați medicamentul după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
 - Nu utilizați Bromhexin Atb dacă observați semne vizibile de deteriorare.
- Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.



6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Bromhexin Atb

- Substanța activă este clorhidrat de bromhexin. Fiecare comprimat conține clorhidrat de bromhexin 8 mg.
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, talc, stearat de magneziu.

Cum arată Bromhexin Atb și conținutul ambalajului

Comprimate rotunde, plate, de culoare albă.

Este ambalat în cutii cu 2 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate

Este ambalat în cutii cu 200 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr.1, 707410 Iași, România.

Acest prospect a fost aprobat în August 2013

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanții locali ai deținătorului autorizației de punere pe piață:

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr.1, 707410 Iași,
România.