

**PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR****Hemorzon unguent**

Tetracilină/acetat de hidroclorizol/benzocaină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Hemorzon și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Hemorzon
3. Cum să utilizați Hemorzon
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Hemorzon
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE HEMORZON ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Hemorzon face parte din clasa de medicamente cunoscută sub denumirea de antihemoroidale de uz topic, combinații. Hemorzon se utilizează pentru atenuarea durerii și mâncărimilor de la nivel anal, în special în crizele hemoroidale și tromboflebită hemoroidală.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI HEMORZON**Nu utilizați Hemorzon**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la hidroclorizol, tetracilină, benzocaină sau la oricare dintre componentele Hemorzon.
- dacă aveți infecții ano-rectale bacteriene (inclusiv tuberculoze), virale, fungice.
- dacă aveți leziuni ano-rectale suprainfectate.

Aveți grijă deosebită când utilizați Hemorzon

Dacă simptomele nu cedează rapid, întrerupeți tratamentul și adresați-vă medicului. Acesta vă poate recomanda efectuarea unui examen proctologic.

Tratamentul cu Hemorzon nu înlocuiește tratamentul specific al afecțiunii anale.

Nu utilizați Hemorzon timp îndelungat. Acesta conține hidroclorizol care, în urma absorbției, poate determina efecte neplăute la nivelul întregului organism.

Utilizarea altor medicamente

Nu se cunosc interacțiuni între Hemorzon și alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.



Utilizarea Hemorzon cu alimente și băuturi

Nu se cunosc interacțiuni între Hemorzon și alimente sau băuturi.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Hemorzon nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI HEMORZON

Utilizați întotdeauna Hemorzon exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și vârstnici

Unguentul se aplică în regiunea anală, după defecație și după toaleta locală sau seara, la culcare. Doza uzuală este de 2 - 3 aplicări unguent pe zi. Tratamentul se continuă încă o săptămână după dispariția fenomenelor locale, aplicându-se unguentul o dată la două zile.

Copii

Nu se recomandă administrarea Hemorzon unguent la copii.

Dacă aveți nelămuriri în ceea ce privește tratamentul cu Hemorzon, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Dacă ați utilizat mai mult Hemorzon decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj cu Hemorzon totuși, dacă suspectați acest lucru, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

Dacă ați uitat să utilizați Hemorzon

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Hemorzon

Întrerupeți tratamentul cu Hemorzon doar la recomandarea medicului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Hemorzon poate determina reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Acestea sunt în general reacții alergice, reacții locale iritative, atrofii ale mucoasei rectale în caz de utilizare prelungită, infecții.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ HEMORZON

Nu utilizați Hemorzon după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.



A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Hemorzon

- Substanțele active sunt: tetraciclina 10 mg (sub formă de clorhidrat de tetraciclină 10,82 mg), acetat de hidrocortizonă 5 mg, benzocaină 4 mg.
- Celelalte componente sunt: ceară galbenă, vaselină albă.

Cum arată Hemorzon și conținutul ambalajului

Hemorzon se prezintă sub formă de unguent omogen, de culoare galbenă până la galben-brun.

Este disponibil în cutii cu un tub din Al a 18 g unguent.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iași, România

Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2014.