

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**IBUFEN 200 mg**
Ibuprofen

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați , Ibufen 200 mg cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 3 zile

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Ibufen 200 mg, comprimate filmate pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Ibufen 200 mg, comprimate filmate
3. Cum să utilizați Ibufen 200 mg, comprimate filmate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ibufen 200 mg, comprimate filmate
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE IBUFEN 200 mg, comprimate filmate ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ibufen 200 mg, comprimate filmate face parte din clasa de medicamente cunoscută sub denumirea de antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene, derivați de acid propionic. Ibufen 200 mg, comprimate filmate este util în ameliorarea durerilor de cap, dinți, a durerilor abdominale apărute în timpul ciclului menstrual, dureri de mușchi, articulații și oase, dureri din bolile reumatismale, precum și a febrei.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

Nu luați IBUFEN 200 mg, comprimate filmate în cazul în care:

- Sunteți alergic la ibuprofen, la alte antiinflamatoare nesteroidiene sau la oricare din excipienții produsului. Informați medicul sau farmacistul dacă ați suferit vreo astfel de reacție alergică. În caz de alergie, întrerupeți utilizarea medicamentului și anunțați medicul,
- Ați suferit o criză de astm bronșic în urma administrării de antiinflamatoare nesteroidiene.
- Sunteți gravidă în ultimul trimestru de sarcină,
- Suferiți de boli grave de rinichi sau ficat,
- Suferiți de insuficiență cardiacă severă (incapacitatea inimii de a pompa sângele)
- Aveți ulcer gastro-duodenal (leziune la nivelul mucoasei stomacului și duodenului),
- Aveți lupus eritematos sistemic (boală inflamatorie autoimună ce afectează mai multe organe)

Aveți grijă deosebită când utilizați IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

-Aveți astm bronșic asociat unei rinite cronice și/sau unei polipoze nazale. În acest caz există un risc mai mare de declanșare a unei crize de astm în urma administrării de ibuprofen sau a unui alt antiinflamator nesteroidian.

-Sunteți vârstnici, slăbiți sau sunteți sub tratament cu anticoagulante sau antiagregante plachetare. În aceste condiții pot apărea hemoragii gastro-intestinale sau ulcere. Acestea se pot declanșa în orice moment în cursul tratamentului, fără vreun simptom de avertizare. În cazul apariției de sângerări la nivelul stomacului sau intestinului sau de dureri în partea superioară a abdomenului, întrerupeți

imediat tratamentul cu Ibufen 200 mg, comprimate filmate și anunțați medicul.(vezi și cap. Folosirea altor medicamente).

-Ați suferit vreo afecțiune digestivă (leziune la nivelul stomacului și duodenului, pătrunderea stomacului în torace prin hiatalul esofagian (orificiul esofagian al diafragmului), sângerări digestive.

-Aveți varicelă, deoarece împreună cu ibuprofen, pot apărea unele complicații grave infecțioase la nivelul pielii. (vezi și cap. Reacții adverse posibile).

- Dacă luați Ibufen 200 mg, comprimate filmate în tratament de lungă durată, poate determina infertilitate prin inhibarea ovulației. Verificați periodic constantele sanguine (hemoleucograma), precum și funcțiile hepatice și renale.

-Dacă aveți tulburări vizuale, nu mai luați Ibufen 200 mg, comprimate filmate și solicitați un examen oftalmologic.

-În cazul pacienților vârstnici sau a celor cu afecțiuni severe ale inimii, ficatului, și rinichiului, supravegheați atent cantitatea de urină eliminată și funcția rinichiului.

Medicamente precum Ibufen 200 mg se pot asocia cu un risc ușor crescut de apariție a atacului de cord („infarct miocardic”). Riscurile de orice tip sunt mai probabile la doze mari și în cazul tratamentului de lungă durată. Nu depășiți doza și durata de 3 zile recomandate pentru tratament.

Dacă aveți probleme cardiace, accident vascular cerebral în antecedente sau considerați că ați putea fi în situație de risc din cauza acestor afecțiuni (de exemplu, dacă aveți hipertensiune arterială, diabet zaharat, valori crescute ale colesterolului sau sunteți fumător) trebuie să discutați despre tratament cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Utilizarea altor medicamente

Dacă luați acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acțiune. Unele medicamente care sunt anticoagulante (acționează împotriva coagulării sângelui) (de exemplu acid acetilsalicilic/aspirină, warfarină, ticlopidină), unele medicamente care acționează împotriva tensiunii arteriale crescute (inhibitori de enzimă de conversie a angiotensinei de exemplu captopril, medicamentele blocante ale beta receptorilor, antagoniști de angiotensină II), antiinflamatoare nesteroidiene, metotrexat, diuretice, glucocorticoizi, medicamente antiepileptice, litiu sau digoxin, și chiar alte medicamente pot afecta sau pot fi afectate de tratamentul cu ibuprofen. Prin urmare cereți sfatul medicului înainte de a utiliza ibuprofen împreună cu alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Folosirea IBUFEN 200 mg, comprimate filmate cu alimente și băuturi

Alimentele încetinesc absorbția de Ibufen 200 mg, comprimate filmate.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu utilizați ibuprofen dacă sunteți gravidă în ultimul trimestru.

Ibufen 200 mg, comprimate filmate trece în laptele matern, de aceea nu folosiți ibuprofen în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Dacă vă simțiți obosit, deprimat, aveți amețeli sau tulburări vizuale în timpul tratamentului cu Ibufen 200 mg, comprimate filmate nu este indicat să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

Informații importante privind unele componente ale IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Ibufen 200 mg, comprimate filmate conține 42,3 mg lactoză/comprimat. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

Ibufen 200 mg, comprimate filmate conține Sunset Yellow (FCF) (E 110) care poate provoca reacții alergice.

3. CUM SĂ LUAȚI IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur cum să luați Ibufen 200 mg, comprimate filmate.

Adulți și copii peste 15 ani: luați 1 - 2 comprimate filmate Ibufen 200 mg de 2 – 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate filmate Ibufen 200 mg pe zi.

Comprimatele filmate se înghit întregi, cu puțină apă, preferabil după mese.

Dacă luați mai mult decât trebuie din IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

Adresați-vă imediat medicul dumneavoastră sau farmacistului.

Orice medicament luat în exces poate avea serioase consecințe. Dacă suspectați supradozajul, anunțați de urgență medicul. Simptomele în cazul supradozajului cu ibuprofen sunt: greață, vărsături, tensiune arterială scăzută și rar, pierderea conștienței.

Nu există antidot specific. La nevoie, se va iniția un tratament specific de către personal medical specializat, evacuând conținutul stomacului prin provocarea de vărsături și prin lavaj gastric.

Dacă uitați să luați IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Este important să nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Ibufen 200 mg, comprimate filmate poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Anunțați imediat medicul dacă observați: scăderea poftei de mâncare, greață, vărsături, arsuri la nivelul stomacului, dureri abdominale, indigestie, leziuni ale stomacului, chiar sângerări la nivelul stomacului și intestinului, colorare în galben a pielii, albului ochilor și mucoaselor, dureri de cap, confuzie, somnolență, confuzie, zgomote în urechi, depresie, tulburări senzoriale, febră, tulburări vizuale, vedere încețoșată, tulburări ale vederii colorate, mâncărimi, erupții ale pielii, acumulare de lichid la nivelul țesuturilor, reacții anafilactice, bronhospasm. Rar, ibuprofenul poate determina crize de astm bronșic la pacienții predispuși. Lupusul eritematos sistemic sau alte boli de collagen pot crește riscul apariției reacțiilor alergice.

Mai pot apare valori anormale ale testelor hepatice, prelungirea timpului de sângerare, modificări ale constantelor sanguine (scăderea numărului de trombocite, granulocite, globule roșii, agranulocitoză, mai ales după administrarea de doze mari de ibuprofen).

La nivelul rinichiului pot apare acumulări de lichide în țesuturi, scăderea cantității de urină eliminată inflamații ale rinichiului, necroză renală sau chiar insuficiență renală (boală severă a rinichiului).

Pot apare ocazional leziuni la nivelul mucoasei bucale, tulburări ale ciclului menstrual, iar excepțional complicații infecțioase ale pielii și ale țesuturilor moi, în caz de varicelă.

Medicamente precum Ibufen 200 mg, comprimate filmate se pot asocia cu un risc ușor crescut de apariție a atacului de cord („infarct miocardic”) sau a accidentului vascular cerebral.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ IBUFEN 200 mg, comprimate filmate

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați Ibufen 200 mg, comprimate filmate dacă observați semne vizibile de deteriorare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Ibufen 200 mg, comprimate filmate

- Substanța activă este ibuprofen 200 mg.
- Celelalte componente sunt:

Nucleu: celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu.

Film: Opadry II 85 F 24409

Compoziția Opadry II 85 F 24409: alcool polivinilic parțial hidrolizat, macrogol 3000, dioxid de titan (E171), talc, eritrozină pe lac de aluminiu (E 127), Sunset Yellow pe lac de aluminiu (E 110), Indigo Carmin pe lac de aluminiu (E 132).

Cum arată Ibufen 200 mg, comprimate filmate și conținutul ambalajului

Comprimate filmate.

Ambalajul

Cutie cu 2 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate filmate
Cutie cu 1 blister PVC/Al cu 10 comprimate filmate
Cutie cu 3 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate filmate

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

S.C.Antibiotice S.A.,
Str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanții locali ai deținătorului autorizației de punere pe piață:

Acest prospect a fost aprobat în ianuarie, 2009