



PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Piador 20 mg comprimate gastrorezistente Pantoprazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați Piador cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 2 săptămâni.
- Nu trebuie să utilizați Piador comprimate mai mult de 4 săptămâni fără să întrebați un medic.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Piador și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Piador
3. Cum să utilizați Piador
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Piador
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE PIADOR ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Piador conține ca substanță activă pantoprazol, care blochează „pompa” care produce acid la nivelul stomacului. Astfel, acesta reduce cantitatea de acid din stomac.

Piador este utilizat pentru tratamentul de scurtă durată al simptomelor asociate bolii de reflux gastroesofagian la adulți (de exemplu arsuri în capul pieptului-pirozis, regurgitare de acid).. Refluxul reprezintă fluxul invers de acid din stomac în esofag („gât”), care poate deveni inflamat și dureros. Aceasta poate produce simptome cum ar fi senzația dureroasă de arsură la nivelul pieptului cu tendință ascendentă înspre gât (pirozis) și un gust acru în gură (regurgitare de acid). Puteți prezenta o ameliorare a simptomelor de reflux acid și de arsură în capul pieptului după numai o zi de tratament cu Piador, însă acest medicament nu este conceput pentru asigurarea unei ameliorări imediate. Ar putea fi necesară administrarea de comprimate timp de 2-3 zile consecutiv pentru a se obține ameliorarea simptomelor.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI PIADOR

Nu utilizați Piador

- Dacă sunteți alergic/ă (hipersensibil/ă) la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Piador (vezi punctul 6).
- dacă luați un medicament care conține atazanavir (pentru tratamentul infecției cu HIV)
- dacă aveți vîrstă sub 18 ani
- dacă sunteți însărcinată sau alăptați.



Aveți grijă deosebită când utilizați Piador

Discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă:

- ați fost tratat pentru arsuri în capul pieptului sau indigestie în mod continuu timp de 4 sau mai multe săptămâni

- aveți vîrstă peste 55 de ani și luați zilnic tratament pentru indigestie eliberat fără prescripție medicală
- aveți vîrstă peste 55 de ani și prezentați simptome noi sau modificate recent
- ați avut ulcer gastric sau ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul stomacului
- aveți probleme hepatice sau icter (îngălbirea pielii sau a ochilor)
- vă prezentați în mod regulat la medic pentru simptome sau afecțiuni grave
- urmează să fiți supuși unei endoscopii sau unui test respirator denumit test cu C-uree.

Informați-vă medicul imediat, înainte sau după ce ați luat acest medicament, dacă remarcăți oricare dintre următoarele simptome, care ar putea fi un semn al unei alte boli, mai grave:

- scădere neintenționată în greutate (necorelată cu o dietă sau un program de exerciții fizice)
- vărsături, în special dacă sunt repetate
- vărsături cu sânge; acesta poate avea un aspect închis la culoare, de zaț de cafea
- observați sânge în scaun; acesta poate avea aspect negru de smoală
- dificultate sau durere la înghițire
- păreți palid și vă simțiți slăbit (anemie)
- durere la nivelul pieptului
- durere de stomac
- diaree severă și/sau persistentă, deoarece Piador a fost asociat cu o mică creștere a diareii infecțioase.

Medicul dumneavoastră poate decide dacă este necesar să efectuați anumite analize.

Dacă urmează să efectuați o analiză a săngelui, informați-vă medicul că luați acest medicament.

Puteți prezenta o ameliorare a simptomelor de reflux acid și arsuri în capul pieptului după numai o zi de tratament cu Piador, însă acest medicament nu este conceput pentru asigurarea unei ameliorări immediate. Nu trebuie să îl utilizați ca măsură preventivă.

Dacă acuzați simptome repetitive de arsuri în capul pieptului sau indigestie de mai mult timp, nu omiteți să vă prezentați în mod regulat la medic.

Utilizarea altor medicamente

Piador poate împiedica anumite medicamente să acționeze adevarat. Informați-vă medicul sau farmacistul dacă utilizați medicamente care conțin una dintre următoarele substanțe active:

- ketoconazol (utilizat pentru infecții fungice);
- warfarină și fenprocumonă (utilizate pentru „subțierea” săngelui și pentru prevenirea apariției de cheaguri). Puteți necesita analize de sânge suplimentare;
- atazanavir (utilizat pentru tratarea infecției cu HIV). Nu trebuie să utilizați Piador în cazul în care luați atazanavir.

Nu luați Piador cu alte medicamente care limitează cantitatea de acid produsă în stomac, cum ar fi un alt inhibitor de pompă protonică (omeprazol, lansoprazol sau rabeprazol) sau un antagonist al receptorilor H₂ (de exemplu ranitidină, famotidină).

Totuși, puteți lua Piador cu antiacide (de exemplu magaldrat, acid alginic, bicarbonat de sodiu, hidroxid de aluminiu, carbonat de magneziu sau combinații din acestea), dacă este necesar.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. Aici sunt incluse de asemenea remedii naturiste sau homeopatice.

Utilizarea Piador cu alimente și băuturi

Comprimatele trebuie înghițite întregi, cu o cantitate suficientă de lichid, înainte de masă.

Sarcina și alăptarea

Nu luați Piador dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravidă sau alăptăți.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.



Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Dacă prezențați reacții adverse cum ar fi amețeală sau tulburări de vedere, nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI PIADOR

Luați întotdeauna Piador exact aşa cum este recomandat în acest prospect. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Luați un comprimat pe zi. Nu depășiți doza zilnică recomandată de 20 mg pantoprazol.

Trebuie să luați acest medicament cel puțin 2-3 zile consecutiv. Opriți administrarea de Piador după dispariția completă a simptomelor. Puteți prezenta o ameliorare a simptomelor de reflux acid și arsuri în capul pieptului după numai o zi de tratament cu Piador, însă acest medicament nu este conceput pentru asigurarea unei ameliorări imediate.

Dacă simptomele nu se ameliorează după administrarea continuă a acestui medicament timp de 2 săptămâni, adresați-vă medicului.

Nu utilizați Piador comprimate mai mult de 4 săptămâni fără să vă adresați medicului dumneavoastră.

Luați comprimatum înainte de masă, la aceeași oră în fiecare zi. Trebuie să înghițiți comprimatum întreg, cu o cantitate de apă. Nu mestecați și nu spargeți comprimatum.

Copii și adolescenți

Piador nu trebuie utilizat de copii și adolescenți cu vîrstă sub 18 ani.

Dacă ați utilizat mai mult Piador decât trebuie

Informați-vă imediat medicul sau farmacistul. Dacă este posibil, luați medicamentul și prospectul cu dumneavoastră. Nu există simptome cunoscute ale supradozajului.

Dacă ați uitat să utilizați Piador

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați următoarea doză în mod normal, în ziua următoare și la ora obișnuită.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Piador poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Informați-vă imediat medicul sau adresați-vă departamentului de urgență al celui mai apropiat spital dacă prezențați oricare dintre următoarele **reacții adverse grave**. Opriți imediat administrarea medicamentului, dar luați acest prospect și/sau comprimatele cu dumneavoastră.

- **Reacții alergice grave (rare)**: reacții de hipersensibilitate, aşa-numitele reacții anafilactice, soc anafilactic și edem angioneurotic. Simptomele tipice sunt: umflarea feței, buzelor, gurii, limbii și/sau gâtului, care pot produce dificultăți la înghițire sau respirație, urticarie (erupții iritative pe piele), amețeală severă cu bătăi foarte rapide ale inimii și transpirație abundantă.

- **Reacții grave pe piele (cu frecvență necunoscută)**: erupție cu tumefacție, pustule sau exfolierea pielii, piele descuamată și sângerări în jurul ochilor, nasului, gurii sau organelor genitale și deteriorarea rapidă a stării generale de sănătate sau erupție pe piele în momentul expunerii la soare.

- **Alte reacții adverse grave (cu frecvență necunoscută)**: îngălbirea pielii și a ochilor (ca urmare a leziunilor hepatice severe) sau probleme renale cum ar fi urinarea durerioasă și durere lombară inferioară cu febră.



Reacțiile adverse pot surveni cu anumite frecvențe, care sunt definite după cum urmează:

- foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10
- frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100
- mai puțin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000
- rare: afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000
- foarte rare: afectează mai puțin de 1 utilizator din 10000
- cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

- Reacții adverse mai puțin frecvente:

dureri de cap; amețelă; diaree; greață, vărsături; balonare și flatulență; constipație; gură uscată; colică și disconfort; eruptii trecătoare pe piele sau urticarie; mâncărime; senzație de slăbiciune, oboseală sau stare generală de rău; tulburări de somn; creșterea enzimelor hepatice la testelete de sânge.

Reacții adverse rare:

tulburare sau lipsa completă a simțului gustului; tulburări de vedere cum ar fi vederea încețoșată; durere la nivelul articulațiilor; dureri musculare; modificări de masă corporală; temperatură a corpului crescută; umflarea extremităților; reacții alergice; depresie; valori crescute ale bilirubinei și lipidelor în sânge (observate la testelete de sânge), creșterea sănilor la bărbați; febră mare sau o scădere bruscă a celulelor albe granulare circulante din sânge (observate la testelete de sânge).

- Reacții adverse foarte rare:

dezorientare; reducerea numărului de trombocite, care vă poate predispune la sângerări și vânătăi mai mult decât normal; reducerea numărului de leucocite, care poate conduce la infecții mai frecvente; coexistența anormală a reducerii numărului de celule albe și roșii ale săngelui, ca și a plachetelor (observate la testelete de sânge).

Cu frecvență necunoscută:

halucinații, confuzie (în special la pacienții cu istoric al acestor simptome); valoare scăzută a sodiului în sânge; valori scăzute de magneziu în sânge.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ PIADOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați Piador după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Piador

- Substanța **activă** este pantoprazolul. Fiecare comprimat gastrorezistent conține 20 mg de pantoprazol (sub formă de sesquihidrat de sodiu).
- **Celelalte componente** sunt: *Nucleu*: carbonat de sodiu anhidru, manitol, crospovidonă, hidroxipropilceluloză, stearat de calciu; *Film*: hipromeloză, propilenglicol, dioxid de titan (E171), oxid galben de fier (E172), copolimer de acid metacrilic-acrilat de etil (1:1), citrat de trietil; *Cerneală de inscriptionare*: shellac glaze 45%, oxid negru de fier (E172), alcool n-butilic, propilenglicol, etanol anhidru, alcool isopropilic.

Cum arată Piador și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de comprimate gastrorezistente în formă de capsule, biconvexe, de culoare galbenă, inscripționate cu "20" cu cerneală neagră pe o singură față.
Cutie cu un blister din Al/Al cu 10 comprimate gastrorezistente.



Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Antibiotice SA
Str. Valea Lupului, nr.1, 707410, Iași
România

Acest prospect a fost aprobat în Aprilie 2013.