

SALIFORM FORTE

Cremă

Compoziție

100 g cremă conțin salicilat de metil 15 g, levomentol 10 g și excipienți: acid stearic, monostearat de glicerol, macrogol 25 cetostearil eter, carbomer (Carbopol Ultrez 10NF), trolamină, apă purificată.

Grupa farmacoterapeutică: produse topice pentru dureri articulare și musculare, produse cu acid salicilic și derivați..

Indicații terapeutice

Înainte eforturilor fizice susținute - pentru relaxarea musculaturii ce urmează a fi solicitată.

Imediat după eforturi fizice susținute - pentru reducerea durerii.

Dureri de origine musculo-tendono-ligamentare determinate de suprasolicitarea musculară.

Contraindicații

Hipersensibilitate la salicilat de metil, levomentol sau la oricare dintre excipienții produsului.

Plăgi deschise, iritații cutanate.

Copii cu vârsta sub 15 ani.

Precauții

Saliform forte se utilizează numai pentru uz extern.

Nu se utilizează sub pansament ocluziv.

Se evită contactul cu ochii și mucoasele.

În cazul apariției iritațiilor cutanate se recomandă întreruperea administrării.

Dacă durerea persistă mai mult de 10 zile fără ameliorare, trebuie consultat medicul.

Interacțiuni

Nu se cunosc.

Atenționări speciale

Copii

Nu se recomandă administrarea la copii cu vârsta sub 15 ani.

Sarcina și alăptarea

Studiile preclinice efectuate la animale au evidențiat efecte teratogene și efecte toxice. Până în prezent nu au fost efectuate studii controlate la om.

Deoarece salicilatul de metil se absoarbe prin piele putând determina fenomene de excitație nervos centrală, mai ales după aplicarea pe suprafețe mari, administrarea *Saliform forte* în timpul sarcinii și alăptării se va face numai după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern - risc potențial fetal.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Saliform forte nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare

Doza recomandată este de 3 - 4 aplicații pe zi. *Saliform forte* se aplică pe piele, masând ușor zona afectată până la absorbția completă.

Reacții adverse*Salicilat de metil*

Deși există dovezi că ingestia de salicilat de metil este riscantă, după administrarea externă conform recomandărilor de mai sus, salicilatul de metil este bine tolerat cu excepția unor cazuri în care au apărut iritații locale severe.

Levomentol

Levomentolul poate determina rar reacții alergice: urticarie, eritem și alte reacții cutanate. Datorită absorbției sistemice după aplicarea pe suprafețe cutanate întinse, sunt de așteptat aceleași reacții adverse ca și în cazul ingestiei unor cantități mari de produse mentolate: greață, dureri abdominale, vărsături, eritem facial și simptome de deprimare a sistemului nervos central (amețeală, mers ebrios, somnolență, bradipnee și comă).

Totuși, numărul reacțiilor adverse legate de administrarea externă a levomentolului este scăzut.

Supradozaj

Nu sunt disponibile date.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un tub din aluminiu a 25 g cremă.

Producător

S.C. Antibiotice S.A., Iași, România

Deținătorul Autorizației de punere de piață

S.C. Antibiotice S.A.

Str. Valea Lupului, nr.1, Iași, România

Data ultimei verificări a prospectului

Februarie, 2013