



Prospect: Informații pentru utilizator

Nistatină Atb 100000 UI ovule

Nistatină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Nistatină Atb și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nistatină Atb
3. Cum să utilizați Nistatină Atb
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Nistatină Atb
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Nistatină Atb și pentru ce se utilizează

Nistatina este un medicament antifungic cu acțiune locală. Acest medicament este utilizat pentru tratamentul infecțiilor vaginale determinate de fungi. Ajută la reducerea mâncărimilor, înroșirii pielii și a iritațiilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nistatină Atb

Nu utilizați Nistatină Atb

- dacă sunteți alergic la nistatină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Nistatină Atb, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. După stabilirea cu certitudine a diagnosticului de candidoză este necesară identificarea și înlăturarea factorilor favorizanți pentru prevenirea recidivelor.

Nistatină Atb împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nistatină Atb nu are nicio influență sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.



3. Cum să utilizați Nistatină Atb

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți

După igienizarea mâinilor se va introduce ovulul în profunzime, în vagin. Pentru a preveni curgerea medicamentului din vagin, este indicată așezarea cât mai curând posibil la orizontală. Pentru a preveni pătarea lenjeriei, se pot folosi tampoane intime externe. Nu este indicată folosirea tampoanelor interne în timpul tratamentului cu acest medicament.

Nistatină Atb ovule se va utiliza la aceeași oră în fiecare zi, pe toată perioada recomandată, chiar dacă simptomele dispar după câteva zile sau chiar dacă începe perioada menstruală.

Doza recomandată este de 1 sau 2 ovule introduse în profunzime în vagin, o dată pe zi, seara, înainte de culcare, pentru 14 zile sau mai mult.

Copii

Nu se recomandă administrarea Nistatină Atb ovule la copii din cauza formei farmaceutice inadecvate vârstei.

Vârstnici

Nu există recomandări speciale de dozaj sau precauții în cazul administrării de Nistatină Atb la vârstnici.

Dacă utilizați mai mult Nistatină Atb decât trebuie

Deoarece absorbția sistemică după administrarea intravaginală a acestui medicament este neglijabilă, supradozajul este puțin probabil.

Dacă uitați să utilizați Nistatină Atb

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Nistatină Atb

Întrerupeți tratamentul cu Nistatină Atb doar la recomandarea medicului dumneavoastră. Întreruperea prea devreme a acestui tratament poate determina reapariția infecției.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Deși foarte puțin probabil, nistatina poate cauza, cu frecvență necunoscută, iritații vaginale. Dacă această reacție adversă persistă sau se agravează, anunțați prompt medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Tot cu frecvență necunoscută pot apărea și reacții alergice, manifestate prin: erupții la nivelul pielii, mâncărimi și umflături (în special ale feței, limbii, gâtului), amețeală, tulburări de respirație. Dacă observați aceste reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Exprimarea frecvenței de apariție a reacțiilor adverse s-a realizat după următoarea convenție:

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane

Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10 000 persoane

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.



5. Cum se păstrează Nistatină Atb

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Nistatină Atb

- Substanța activă este nistatina. Un ovul conține nistatină 100000 UI.
- Celelalte componente sunt gliceride de semisinteză.

Cum arată Nistatină Atb și conținutul ambalajului

Nistatină Atb se prezintă sub formă de ovule de culoare gălbuie, de formă ovoidă, cu suprafața netedă onctuoasă și aspect omogen în secțiune.

Cutie cu 1 folie termosudată din PVC-PE a 7 ovule

Cutie cu 1 folie termosudată din PVC a 7 ovule

Cutie cu 2 folii termosudate din PVC-PE a câte 7 ovule

Cutie cu 2 folii termosudate din PVC a câte 7 ovule

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr.1

707410 Iași

România

Acest prospect a fost revizuit în iulie 2015.