




# Aceclofen®

Paracetamol 500 mg + Diclofenac 50 mg  
Supozitoare



Aceclofen® este indicat în:

## 1. Boli reumatismale inflamatorii sau degenerative:



1 din 3

• persoane suferă de dureri lombare

1 din 2

• femei suferă de dismenoree primară

1 din 6

• românce suferă de dimenoree la fiecare ciclu menstrual

## 2. Afecțiuni dureroase și/sau inflamatorii în patologia ginecologică

Dismenoree primară Anexită

Pentru detalii, consultați RCP-ul.



## Avantajele Aceclofen®

- Asociere de substanțe active cu mecanisme diferite în combaterea eficientă a durerii
- Efect analgezic și antiinflamator
- Ameliorarea marcată a simptomatologiei
- Diminuarea durerii pe timpul nopții

Compensat 100% pe lista C3

## Studii

### • Combinăția diclofenac – paracetamol

Într-un studiu clinic randomizat dublu orb, pacienții cărora li s-a administrat o combinație de diclofenac și paracetamol au utilizat cu 38% mai puțină morfină în comparație cu pacienții cărora li s-a administrat paracetamol.

Munishankar B, Fettes P, Moore C et al: A double-blind randomised controlled trial of paracetamol, diclofenac or the combination for pain relief after caesarean section, Int J Obstet Anesth., 2008; 17(1): 9-14;

- Supozitoarele cu diclofenac au demonstrat un efect analgezic mai bun față de supozitoarele de indometacin pentru durerea din afecțiunile ginecologice

În 2 studii clinice randomizate dublu orb, cele două analgezice au fost evaluate în mod similar și au oferit o ameliorare satisfăcătoare a durerii. Diclofenacul poate fi preferat deoarece este administrat într-o singură doză și necesită mai puțin timp de îngrijire medicală. De asemenea, este o alternativă substanțial mai puțin costisitoare față de noile tehnologii de tratare a durerii utilizate în prezent.

Clin Exp Obstet Gynecol 2012;39(1):112-4. Comparison of diclofenac sodium with indomethacin suppositories for mediolateral episiotomies. A C Altungül 1, E Sapmaz, A Kale. Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22675968/>

Arch Gynecol Obstet. 2009 Nov;280(5):735-8. doi: 10.1007/s00404-009-1006-3. Epub 2009 Feb 26. Comparison of the efficacy of diclofenac and indomethacin suppositories in treating perineal pain after episiotomy or laceration: a prospective, randomized, double-blind clinical trial. Recep Yıldızhan 1, Begüm Yıldızhan, Sadık Sahin, Necdet Suer. Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19242709/>

## Referințe

World Health Organization, Chronic rheumatic conditions, [www.who.int](http://www.who.int)

Stella Iacovides, Ingrid Avidon, Fiona C. Baker, What we know about primary dysmenorrhea today: a critical review, Human Reproduction Update, Volume 21, Issue 6, November/December 2015

## Referințe

Aceclofen® este un medicament ce se eliberează pe bază de prescripție medicală



Acest material promotional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru informații detaliate, vă rugăm consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului sau cereți reprezentantului medical o copie a acestuia. Data revizuirii textului: Decembrie 2018.

Antibiotice