


# Aceclofen®

Paracetamol 500 mg + Diclofenac 50 mg  
Supozitoare



**Aceclofen® este indicat în afecțiuni dureroase și/sau inflamatorii în patologia ginecologică**



## Doze și mod de administrare:



**Adulti** Doza zilnică recomandată este de 1-2 supozitoare Aceclofen®



**Copii** Nu se recomandă utilizarea de Aceclofen® la copii sub 12 ani.

**1 din 2**

• femei suferă de dismenoree primară



**1 din 6**

• femei suferă de dismenoree primară la fiecare ciclu menstrual



**În dismenoreea primară, tratamentul trebuie început înaintea apariției primelor manifestări și în funcție de simptomatologie trebuie continuat câteva zile.**

Doza inițială

1-2 supozitoare

Doza maximă

1-2 supozitoare

+

la nevoie, maxim 100 mg diclofenac oral

Pentru detalii, consultați RCP-ul.



## Avantajele Aceclofen®

- Asociere de substanțe active cu mecanisme diferite în combaterea eficientă a durerii
- Efect analgezic și antiinflamator
- Ameliorarea marcată a simptomatologiei
- Diminuarea durerii pe timpul nopții

Compensat 100% pe lista C3

## Studii

### • Combinarea diclofenac – paracetamol

Într-un studiu clinic randomizat dublu orb, pacienții cărora li s-a administrat o combinație de diclofenac și paracetamol au utilizat cu 38% mai puțină morfină în comparație cu pacienții cărora li s-a administrat paracetamol.

Munishankar B, Fettes P, Moore C et al: A double-blind randomised controlled trial of paracetamol, diclofenac or the combination for pain relief after caesarean section, Int J Obstet Anesth., 2008; 17(1): 9-14;

- Supozitoarele cu diclofenac au demonstrat un efect analgezic mai bun față de supozitoarele de indometacin pentru durerea din afecțiunile ginecologice

În 2 studii clinice randomizate dublu orb, cele două analgezice au fost evaluate în mod similar și au oferit o ameliorare satisfăcătoare a durerii. Diclofenacul poate fi preferat deoarece este administrat într-o singură doză și necesită mai puțin timp de îngrijire medicală. De asemenea, este o alternativă substanțial mai puțin costisitoare față de noile tehnologii de tratare a durerii utilizate în prezent.

Clin Exp Obstet Gynecol 2012;39(1):112-4. Comparison of diclofenac sodium with indomethacin suppositories for mediolateral episiotomies. A C Altıngül 1, E Sapmaz, A Kale. Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22675968/>

Arch Gynecol Obstet. 2009 Nov;280(5):735-8. doi: 10.1007/s00404-009-1006-3. Epub 2009 Feb 26. Comparison of the efficacy of diclofenac and indomethacin suppositories in treating perineal pain after episiotomy or laceration: a prospective, randomized, double-blind clinical trial. Recep Yıldızhan 1, Begüm Yıldızhan, Sadık Sahin, Necdet Suer. Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19242709/>

## Referințe

World Health Organization, Chronic rheumatic conditions, [www.who.int](http://www.who.int)  
Stella Iacovides, Ingrid Avidon, Fiona C. Baker, What we know about primary dysmenorrhea today: a critical review, Human Reproduction Update, Volume 21, Issue 6, November/December 2015

**Aceclofen® este un medicament ce se eliberează pe bază de prescripție medicală**



Acest material promotional este destinat profesionistilor din domeniul sănătății. Pentru informații detaliate, vă rugăm consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului sau cereți reprezentantului medical o copie a acestuia. Data revizuirii textului: Decembrie 2018.

**Antibiotice a+**