




Aceclofen®

Paracetamol 500 mg + Diclofenac 50 mg
Supozitoare




Aceclofen® este indicat în:

1. Boli reumatismale inflamatorii sau degenerative:



2. Afecțiuni dureroase și/sau inflamatorii în patologia ginecologică



1 din 2



- români suferă de boli reumatismale
- români suferă de lombalgii

1 din 2



- românce postpubertate suferă de dimenoree primară

1 din 6



- românce suferă de dimenoree la fiecare ciclu menstrual

Doze și mod de administrare:

Pentru detalii, consultați RCP-ul.

RCP

18+

Adulți: Doza zilnică recomandată este de 1-2 supozitoare Aceclofen®

12-

Copii: Nu se recomandă utilizarea de Aceclofen® la copii sub 12 ani.

Avantajele Aceclofen®

- ✓ Combinație de substanțe active cu mecanisme diferite în combaterea eficientă a durerii
- ✓ Efect analgezic și antiinflamator
- ✓ Ameliorarea marcată a simptomatologiei
- ✓ Diminuarea durerii pe timpul nopții



Compensat 100%
pe lista C3

Avantajele formei farmaceutice de supozitor

- ✓ Combinație unică sub formă farmaceutică – supozitoare
- ✓ Ocolirea primului pasaj hepatic și a celui gastro-intestinal
- ✓ Posibilitatea utilizării la pacienți cu dificultăți de deglutiție, vărsături, inconștienți

Studii

• Combinația diclofenac – paracetamol

Într-un studiu clinic randomizat dublu orb, pacienții cărora li s-a administrat o combinație de diclofenac și paracetamol au utilizat cu 38% mai puțină morfină în comparație cu pacienții cărora li s-a administrat paracetamol.

Munishankar B, Fettes P, Moore C et al: A double-blind randomised controlled trial of paracetamol, diclofenac or the combination for pain relief after caesarean section, Int J Obstet Anesth., 2008; 17(1): 9-14;

- Supozitoarele cu diclofenac au demonstrat un efect analgezic mai bun față de supozitoarele de indometacin pentru durerea din afecțiunile ginecologice

În 2 studii clinice randomizate dublu orb, cele două analgezice au fost evaluate în mod similar și au oferit o ameliorare satisfăcătoare a durerii. Diclofenacul poate fi preferat deoarece este administrat într-o singură doză și necesită mai puțin timp de îngrijire medicală. De asemenea, este o alternativă substanțial mai puțin costisitoare față de noile tehnologii de tratare a durerii utilizate în prezent.

Clin Exp Obstet Gynecol 2012;39(1):112-4. Comparison of diclofenac sodium with indomethacin suppositories for mediolateral episiotomies. A C Altunçölü I, E Sapmaz, A Kale. Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22675968/>

Arch Gynecol Obstet. 2009 Nov;280(5):735-8. doi: 10.1007/s00404-009-1006-3. Epub 2009 Feb 26. Comparison of the efficacy of diclofenac and indomethacin suppositories in treating perineal pain after episiotomy or laceration: a prospective, randomized, double-blind clinical trial. Recep Yildizhan I, Begum Yildizhan, Sadik Sahin, Necdet Suer. Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19242709/>

Referințe

1. Dr. Ancuta IOAN, Spitalul I. Cantacuzino, Bucuresti, Romania "MANAGEMENTUL PACIENTULUI CU POLIARTRITA REUMATOIDA IN ROMANIA" MANAGEMENT IN HEALTH, VOL 15, NO 2 (2011)
2. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA "Durerea lombară la adult Protocol clinic național" 2013
3. DISMENOREEA PRIMARĂ – CONCEPTE MODERNE LEGATE DE PATOGENEZĂ, DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Ina TOCARCIUC*, Corina CARDANIUC*, V. FRIPTU*, M. TODIRAS**, M. SURGUCI*, V. MĂMĂLIGĂ* Catedra de Obstetrică și Ginecologie a USMF „ Nicolae Testemițanu"
4. Boala inflamatorie pelviană Elena Popa, Ana-Aurelia Chiș-Șerban, Carmen Manole, Andrei Popa, Adorata Coman 2019 DOI: 10.26416/MED.132.6.2019.2659



Aceclofen® este un medicament ce se eliberează pe bază de prescripție medicală

RCP

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru informații detaliate, vă rugăm consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului sau cereți reprezentantului medical o copie a acestuia. Data revizuirii textului: Decembrie 2018.

Antibiotice **a+**