

Antibiotice **a+**

Sanygel

Gel dezinfectant pentru mâini



Descrierea produsului:

Sanygel

este un gel dezinfectant pentru mâini (produs TP1) avizat de către Ministerul Sănătății - Comisia Națională Pentru Produse Biocide. Aviz nr. 5648BIO/01/12.24.

Detalii produs:

Conține: **etanol denaturat 80 % (m/m)**, nr.CAS 64-17-5, nr.CE 200-578-6

Produsul conține ingrediente pentru protecția și hidratarea pielii **glicerol și propilenglicol**.

Eficacitate:

- **bactericid** conform: **EN 1500:** *Escherichia coli* K12 NCTC 10538 utilizat nediluat, timp de contact 1 min.;
- **bactericid** conform: **EN 12791+A1:** dezinfectant chirurgical pentru mâini cu efect imediat și după 3 ore utilizat nediluat, timp de contact 3 min.;
- **bactericid** conform: **EN 13727+A2:** *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442, *Enterococcus hirae* ATCC 10541, *Escherichia coli* K12 NCTC 10538 utilizat nediluat, timp de contact 1 min. în condiții de curățenie și murdărie;
- **bactericid** conform: **EN 1276:** *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442, *Enterococcus hirae* ATCC 10541, *Escherichia coli* K12 NCTC 10538 utilizat nediluat, timp de contact 1 min. în condiții de curățenie și murdărie;
- **fungicid** conform: **EN 13624:** *Candida albicans* ATCC 10231, *Aspergillus brasiliensis (niger)* ATCC 16404 utilizat nediluat, timp de contact 1 min. în condiții de curățenie și murdărie;
- **levuricid** conform: **EN 1650:** *Candida albicans* ATCC 10231 utilizat nediluat, timp de contact 1 min. în condiții de curățenie și murdărie;
- **micobactericid, tuberculocid** conform: **EN 14348:** *Mycobacterium avium* ATCC 15769, *Mycobacterium terrae* ATCC 15755 utilizat nediluat, timp de contact 1 min. în condiții de curățenie și murdărie;
- **virucid** conform: **EN 14476+A2:** *Poliovirus tip 1* ATCC VR-192, *Adenovirus tip 5* ATCC VR-5, *Murine Norovirus (tulpina S99 Berlin)*, *Rotavirus*, *Filoviridae*, *Flavivirus*, *Herpesviridae*, *Virusul hepatitei A*, *Virusul hepatitei B*, *Virusul HIV*, *Influenza virus*, *Paramyxoviridae*, *Virusul rubeolei*, *Virusul*

rujeolei, *Virusul ratic*, etc.) utilizat nediluat, timp de contact 1 min. în condiții de curățenie și murdărie;

- **virucid** pentru virusuri anvelopate conform:

EN 14476+A2: *Vaccinia virus tulpina Ankara (MVA)* ATCC VR-1508, *Coronavirus 229E* ATCC VR-740 utilizat nediluat, timp de contact 1 min. în condiții de curățenie și murdărie;

Etanolul este una dintre cele mai utilizate substanțe biocide cu eficacitate asupra unui spectru antimicrobian larg: bactericid, fungicid/levuricid, virucid inclusiv Coronavirusurile. Nu se utilizează în stare pură, ci în soluție apoasă, deoarece apa este necesară ca alcoolul să poată fi absorbit la suprafața celulei microbiene în timp ce alcoolul pur, în concentrații înalte, determină fenomene de coagulare la nivelul celulei, formând astfel o barieră de protecție. Eficacitatea etanolului este optimă la concentrații cuprinse între 60-90%. Distrugerea microorganismelor apare datorită afectării în primul rând a proteinelor membranare și apoi a celor celulare.

Avantaje:



Eficacitate cu spectru larg



Acțiune rapidă



pH neutru, neiritant și bine tolerat de piele



Aplicare ușoară



Gel incolor



Timp de uscare redus



Fără parfum adăugat

Domeniul de utilizare:

- se utilizează în domeniile agro-alimentar, casnic, colectivități și în domeniul medical pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare.
- categorii de utilizatori: profesionali, populație.



Tip preparat:

- gel dezinfectant gata de utilizare

Timp de acțiune:

- pentru efect bactericid conform: EN 1500 - 1 minut;
EN 12791+A1 - 3 minute în condiții de curățenie și murdărie;
EN 13727+A2 - 1 minut în condiții de curățenie și murdărie;
EN 1276 - 1 minut în condiții de curățenie și murdărie;
- pentru efect levuricid conform: EN 1650 - 1 minut în condiții de curățenie și murdărie.
- pentru efect fungicid conform: EN 13624 - 1 minut în condiții de curățenie și murdărie;
- pentru efect micobactericid, tuberculocid conform: EN 14348 - 1 minut în condiții de curățenie și murdărie;
- pentru efect virucid conform: EN 14476+A2 - 1 minut în condiții de curățenie și murdărie;
- pentru efect virucid pentru virusuri avelopate conform: EN 14476+A2 - 1 minut în condiții de curățenie și murdărie;

Indicațiile de folosire și dozaj:

Dezinfectarea igienică a mâinilor prin frecare. Se aplică 3 ml în palme și se distribuie prin frecare pe toată suprafața mâinilor, inclusiv pe degete și între acestea, timp de 1 minut pentru efect bactericid, fungicid, levuricid, micobactericid/tuberculocid și virucid.

Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor prin frecare. Se aplică de 2 ori câte 3 ml în palme și se distribuie pe toată suprafața mâinilor, inclusiv pe degete și între acestea și pe antebraț până la cot, timp de 1,5 minute la fiecare aplicare. 3 ml reprezintă o doză prin 2 acționări de pompiță. Durata totală a procedurii: 3 minute.

Din gama soluții dezinfectante mai avem:

a+Oxy

Soluție dezinfectantă



Producător: Antibiotice SA

Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iași, România

Tel: +40 232 209 000 / +40 372 065 000

Fax: +40 372 065 633

www.antibiotice.ro

E-mail: office@antibiotice.ro